

acquista vardenafil vardenafil acquisto

โพสต์โดย FerdinandIrving - 31 ม.ค. 2026 23:52

Farmacia europea

Visita il nostro sito web per acquistare vardenafil

Dovessero comprare vardenafil in linea --> tinyurl.com/vardenafil10mg20mg40mg60mg

Forma medica: pillola

Necessaria la prescrizione: Nessuna prescrizione richiesta

Disponibilità: In magazzino!

Pillole bonus e grandi sconti su ogni ordine

Informazioni dettagliate sui prodotti medici

Transazioni private

Levitra ☐ responsabile per l'ampliamento e il rilassamento dei vasi sanguigni che portano il sangue al pene.

Levitra ☐ stato studiato dalla societ  farmaceutica Bayer/GlaxoSmithKline e usa Vardenafil HCl come il componente principale di questo farmaco. Levitra ☐ un medicinale preso per via enterale ed usato per trattamento della disfunzione erettile. Stimolazione sessuale causa produzione e rilascio dell'ossido nitrico dalle estremit  nervose del corpo cavernoso del pene attivando cos  un'enzima di guanylate cyclase. En su turno guanylate cyclase ☐ responsabile di produzione di ciclico guanosine monophosphate (cGMP). Il cGMP causa effetto vasodilatatore e rilassamento di vasi sanguigni quali portano sangue al pene. Levitra previene che cGMP venga distrutto dall'enzima di phosphodiesterase-5 e cos  aiuta l'accesso dell'afflusso di sangue al pene.

La dose consigliata di Levitra di 10 mg giornalieri viene presa 1 ora prima del coito. Se nessun effetto collaterale ☐ stato osservato la dose pu  essere maggiorata fino 20 mg. Nel caso di avversi effetti la dose viene ridotta fino 5 mg giornalieri. Non prendete pi  di una pastiglia di Levitra al giorno.

Levitra non ☐ stato provato sui pazienti con malattia cardiovascolare, perci  ☐ sconsigliato che persone con insulto o insufficienza cardiaca, o attacco cardiaco nell'anamnesi (soprattutto durante 6 mesi precedenti) prendino Levitra. Prima di prendere Levitra informate il vostro medico se avete problemi

renali o epatici, emorragie, ulcera di stomaco o disturbi di retina, come retinite pigmentosa, reazioni allergiche a questo farmaco o qualsiasi altro medicinale, deformazione del pene (incurvatura), fibrosi alveolare (malattia di Peyronie), ed anche malattie quali causano sviluppo di priapismo, anemia di emociti, mieloma multiple, leucemia.

Levitra ☐ controindicato ai pazienti quali hanno ipersensibilità ☐ a alcuni componenti di quest'ultimo o vengono curati con nitrati organici.

I pazienti minori di 16 anni o quali prendono inibitori di proteasi di HIV (ossia indinavir e ritonavir) non possono prendere il farmaco.

Ricerche simili:

[varденафил acquisto on line](#)

[varденафил acquisto](#)

[varденафил senza ricetta](#)

[acquistare varденафил](#)

[acquista varденафил](#)

Italia: Petignano, Afragola, Vada, Biassono, San Giovanni la Punta, Pordenone, Milan, Pomigliano d'Arco, San Giovanni Lupatoto, Capaci, Acireale, Messina, Reggio Emilia, Padua, Cesano Maderno, Genoa, Seregno.

=====