

acquista vardenafil vardenafil acquisto on line

โพสต์โดย ShanelHedge - 18 ก.พ. 2026 03:15

Farmacia europea

Clicca sul link qui sotto per acquistare vardenafil

Acquistare vardenafil ==> phrmc.short.gy/vardenafil

Forma medica: pillola

Necessaria la prescrizione: Nessuna prescrizione richiesta (nella nostra farmacia)

Disponibilità: In magazzino!

Pillole bonus e grandi sconti su ogni ordine

Anonimato completo e legale

Consegna e totale privacy

Levitra ☐ responsabile per l'ampliamento e il rilassamento dei vasi sanguigni che portano il sangue al pene.

Levitra ☐ stato studiato dalla societ  farmaceutica Bayer/GlaxoSmithKline e usa Vardenafil HCl come il componente principale di questo farmaco. Levitra ☐ un medicinale preso per via enterale ed usato per trattamento della disfunzione erettile. Stimolazione sessuale causa produzione e rilascio dell'ossido nitrico dalle estremit  nervose del corpo cavernoso del pene attivando cos  un'enzima di guanylate cyclase. En su turno guanylate cyclase ☐ responsabile di produzione di ciclico guanosine monophosphate (cGMP). Il cGMP causa effetto vasodilatatore e rilassamento di vasi sanguigni quali portano sangue al pene. Levitra previene che cGMP venga distrutto dall'enzima di phosphodiesterase-5 e cos  aiuta l'accesso dell'afflusso di sangue al pene.

La dose consigliata di Levitra di 10 mg giornalieri viene presa 1 ora prima del coito. Se nessun effetto collaterale ☐ stato osservato la dose pu  essere maggiorata fino 20 mg. Nel caso di avversi effetti la dose viene ridotta fino 5 mg giornalieri. Non prendete pi  di una pastiglia di Levitra al giorno.

Levitra non ☐ stato provato sui pazienti con malattia cardiovascolare, perci  ☐ sconsigliato che persone con insulto o insufficienza cardiaca, o attacco cardiaco nell'anamnesi (soprattutto durante 6 mesi precedenti) prendino Levitra. Prima di prendere Levitra informate il vostro medico se avete problemi

renali o epatici, emorragie, ulcera di stomaco o disturbi di retina, come retinite pigmentosa, reazioni allergiche a questo farmaco o qualsiasi altro medicinale, deformazione del pene (incurvatura), fibrosi alveolare (malattia di Peyronie), ed anche malattie quali causano sviluppo di priapismo, anemia di emociti, mieloma multiple, leucemia.

Levitra ☐ controindicato ai pazienti quali hanno ipersensibilità ☐ a alcuni componenti di quest'ultimo o vengono curati con nitrati organici.

I pazienti minori di 16 anni o quali prendono inibitori di proteasi di HIV (ossia indinavir e ritonavir) non possono prendere il farmaco.

Ricerche simili:

acquistare vardenafil

vardeafil senza ricetta

acquista vardenafil

vardeafil acquisto on line

vardeafil acquisto

Italia: Pavia, Acireale, Mazara del Vallo, Cusano Milanino, Campi Bisenzio, Rome, Trentola, Brescia, Varedo, Pavona, Corigliano-Rossano, Varese, Gambettola, Vittoria, Palermo, Bollate, Velletri, Nerviano, Viterbo, Mugnano di Napoli, Vicenza, Calolziocorte, Battipaglia, Vanzago, Santa Maria degli Angeli, Agrigento, Como, Castellanza, Modica, Moncalieri, Cercola, Sant'Agata sui Due Golfi, Terni, Pomigliano d'Arco, Albignasego, Potenza, Busto Arsizio, Guidonia Montecelio, Canegrate, Gricignano d'Aversa, Caivano, Castellammare di Stabia, Villa Opicina, Acilia, Naples, Boscotrecase, Andria.

=====